

APOIO FARMACOTÉCNICO



Base para logurte

Fase	Componentes	INCI Name	Quantidades (g) para 1 sachê	Fornecedor
1	Polidextrose	<i>Polydextrose</i>	20,000	Diversos
1	Carboximetilcelulose	<i>Cellulose Gum</i>	1,000	Diversos
1	Sucralose	<i>Sucralose</i>	0,150	Diversos
1	Acessulfame K	<i>Potassium</i>	0,150	Diversos
1	Xilitol	<i>Xylitol</i>	2,000	Diversos
1	Dióxido de Silício Coloidal	-	0,250	Diversos
1	Benzoato de Sódio	<i>Sodium Benzoate</i>	0,300	Diversos
1	Ácido Tartárico (Pó A 25 %)	<i>Tartaric Acid</i>	0,500	Diversos
1	Aroma (Pó)	-	1,000	Diversos
1	Corante (Pó) Opcional	-	0,010	Diversos
1	Nutriente Funcional	-	(x) mg	-
			~ 25,000	

MODO DE PREPARO



- Homogeneização dos pós através da técnica da Diluição Geométrica;
- Pesar todos os componentes da Fase 1 da formulação;
- Coloque o componente presente em menor quantidade no gral;
- Selecione um componente presente em maior quantidade e coloque no gral uma quantidade aproximadamente igual ao volume de pó do primeiro componente;
- Triture bem os pós até obter uma mistura uniforme;
- Adicione um volume de pó do segundo componente igual ao volume de pó da mistura presente no gral e triture bem;
- Continue adicionando os pós no gral dessa mesma forma até que todos os componentes sejam adicionados;
- Tamisar a Fase 1 em tamis nº 50 a 60;
- Pesar a quantidade de pó para cada dose e acondicionar em sachês de tamanho adequado e selar;
- Dispensar os sachês em uma caixa ou pote rotulado.