



Gotas Dermatológicas Anti-Acne Secativas

Fase	Componentes	INCI Name	Composição (%)	Fornecedor
1	ÁGUA	<i>WATER</i>	QSP	-
1	NAOH (SOL. 20%)	<i>SODIUM HYDROXIDE</i>	1,000	DIVERSOS
1	EDTA	<i>DISODIUM EDTA</i>	0,100	DIVERSOS
2	ZEMEA	<i>PROPANEDIOL</i>	8,000	SARFAM
2	ACIDO SALICILICO	<i>SALICYLIC ACID</i>	2,000	DIVERSOS
2.1	ALCOOL	<i>ALCOHOL</i>	30,000	PHARMA SPECIAL
3	COSMACOL NII-9	<i>C12-13 PARETH-9</i>	3,000	PHARMA SPECIAL
3	SPECTRASTAT	<i>CAPRYLHYDROXAMIC ACID (AND) CAPRYLYL GLYCOL (AND) GLYCERIN</i>	0,800	FAGRON
4	PELEMOL G7-A	<i>GLYCERETH 7 TRIACETATE</i>	5,000	MIDELT
5	ACNELESS	<i>WATER (AND) SALVIA OFFICINALIS (AND)QUILLAYA SAPONARIA (AND) ZIZYPHUS JOAZEIRO (AND) ALCOHOL (AND) GLYCERIN (AND) SACCHAROMY- CES SILICON FERMENT (AND) SACCHAROMYCES MAGNESIUM FERMENT (AND)SACCHAROMYCES COPPER FER-MENT (AND) SACCHARO- MYCES AIRON FERMENT (AND) SACCHAROMYCES ZINC FERMENT (AND) SALIX ALBA (WILLOW) BARK EXTRACT (AND) ZINC PCA (AND) LACTIC ACID (AND) SODIUM BENZOATE (AND) SORBISTAT POTASSIUM.</i>	2,000	BIOVITAL



Fase	Componentes	INCI Name	Composição (%)	Fornecedor
6	AQUAPORINE AQP-3	GLUTAMYLAMIDOETHYL INDOLE (AND) SILANETRIOL TREHALOSE ETHER (AND) GLYCERIN	2,000	AQIA

Modo de Preparo

- Em recipiente adequado, pesar toda fase 1 e homogeneizar;
- Em recipiente auxiliar adequado, pesar fase 2 e aquecer sob agitação até completa solubilização do ácido salicílico, resfriar e adicionar fase 2.1 e homogeneizar. Após completa homogeneização de ambas as fases, verter sob sistema principal;
- Em recipiente auxiliar adequado, pesar fase 3 e homogeneizar. Em seguida adicionar fase 4 e homogeneizar. Após completa homogeneização de ambas as fases, verter sob sistema principal;
- Pesar fase 5 diretamente sob sistema principal e homogeneizar;
- Pesar fase 6 diretamente sob sistema principal e homogeneizar;
- Envazar.

*Prezado farmacêutico, a embalagem conta-gotas pode ser encontrada na VEPAKUM.



Consulfarma
nosso DNA é MAGISTRAL

f /consulfarma @consulfarma
consulfarma.com