



Menu

Bariátrico

Desenvolvido por:
Luiz Moreira

Cirurgia Bariátrica **Ômega-3**

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O tratamento cirúrgico bariátrico pode resultar na perda de peso e também em melhores condições de saúde ao indivíduo. A suplementação nutricional é importante no auxílio das condições de saúde desses pacientes para a cirurgia possa ocorrer bem, principalmente na questão metabólica.



OMEGAVIE® DHA 70 é um é um óleo de peixe concentrado produzido a partir de subprodutos de atum de alto valor para alimentos que contém altos níveis de ácidos graxos DHA Ômega-3 marinhos sob a forma de triglicerídeos.

Benefícios:

- Sustentabilidade e rastreabilidade garantidos;
- Processo isento de solventes;
- Produtos sem contaminação por metais pesados.

Estabilidade

1 - pH de Estabilidade:

- Não Aplicável.

2 - Temperatura de Estabilidade:

- Para que se mantenha estável, o produto deve ser armazenado ao abrigo de calor, luz e umidade.

Formulação - Emulsão

Prezado (a) Farmacêutico (a),

Siga corretamente o modo de preparo e os componentes da formulação. Os ingredientes e os cuidados no preparo influenciam diretamente no sabor e na estabilidade do produto final.

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Consulfarma.

Emulsão de OMEGAVIE® DHA 70

Sabor Abacaxi

Fase	Componentes	INCI Name	Quantidade
1	OMEGAVIE® DHA 70	<i>Oil Extracted from Seaweed</i>	35 g
1	Aroma de Abacaxi	<i>Liquid pineapple flavor</i>	6.6 g
1	Polymol 812	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	3.6 g
2	Lecitina	<i>Lecithin</i>	1.5 g
2	Água	<i>Aqua</i>	42.9 g
3	Flavor de Abacaxi	<i>Pineapple Flavor</i>	9.0 g
3	Stevia	<i>Rebaudiosídeo</i>	0.99 g
3	Taumatina	<i>Taumatine</i>	0.066 g
3	Ácido Cítrico	<i>Citric Acid</i>	0.33 g

Modo de Preparo

- Em um recipiente com capacidade adequada, pesar os componentes da fase 1 de acordo com a ordem em que estão listados;
- Pesar os componentes da fase 2 e levar sobre agitação;
- Pesar a fase 3 em recipiente e balança adequada, verter sobre a fase 2 e homogeneizar;
- Em alta agitação, verter a fase 2 na fase 1.

***Pode ser administrado por crianças**

Emulsão de OMEGAVIE® DHA 70

Sabor Morango

Fase	Componentes	INCI Name	Quantidade
1	OMEGAVIE® DHA 70	<i>Oil Extracted from Seaweed</i>	33,00 g
1	Essência de Blueberry	<i>Liquid pineapple flavor</i>	9,90 g
1	Polymol 812	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	4,62 g
2	Lecitina	<i>Lecithin</i>	1,49 g
2	Água	<i>Aqua</i>	41,25 g
2	Flavor de Morango	<i>Strawberry Flavor</i>	9,9 g
2	Stevia	<i>Rebaudiosídeo</i>	0,66 g
2	Taumatina	<i>Taumatine</i>	0,066
2	Ácido Cítrico	<i>Citric Acid</i>	0,33 g

Modo de Preparo

- Em recipiente com tamanho adequado, juntar componentes da fase 1 um a um e reservar;
- Juntar componentes sólidos da fase dois em almofariz e triturar até obter um pó homogêneo;
- Verter a água e os componentes sólidos da fase dois no recipiente que contém a fase 1 e colocar sob agitação intensa.

***Pode ser administrado por crianças**



Consulfarma
nosso DNA é MAGISTRAL

/consulfarma
consulfarma.com

Como prescrever :

Emulsão de OMEGAVIE® DHA 70

Sabor Abacaxi

OMEGAVIE® DHA 70.....35 g
Excipiente qsp..... 1 Frasco

Administrar 5 mL uma a duas vezes ao dia
ou conforme orientação médica

Emulsão de OMEGAVIE® DHA 70

Sabor Morango

OMEGAVIE® DHA 70.....33 g
Excipiente qsp..... 1 Frasco

Administrar 5 mL uma a duas vezes ao dia
ou conforme orientação médica



Consulfarma
nosso DNA é MAGISTRAL

/consulfarma
consulfarma.com

Referências Bibliográficas

Ferreira, A. O. **Guia Prático da Farmácia Magistral**. 2º Edição, Juiz de Fora:2002

Batistuzzo, J. A. O. **Formulário Médico Farmacêutico**. 2º Edição, Tecnopress:São Paulo, 2002

Ferreira, A. O. **Preparações Orais Líquidas**. Ed. Pharmabooks, São Paulo, 2005

Rowe, R.; et al. **Handbook of Pharmaceutical Excipients**. 5ª ed. Editora Pharmaceutical Press.

PRISTA, L. N.; ALVES, C. A.; MORGADO, R. **Técnica farmacêutica e farmácia galênica**. 4.ed. Lisboa: Fundação Calouste-Gulbenkian.

Material do Fornecedor: AQIA

Índice de Fornecedores

Matéria prima	Fornecedor
Ácido Cítrico	Diversos
Aroma de Abacaxi	Via Farma
Essência de Blueberry	Via Farma
Flavor de Abacaxi	PharmaSpecial
Flavor de Morango	PharmaSpecial
Lecitina	Via Pharma
OmegaVie DHA	AQIA
Polymol 812	AQIA
Stevia	Nutramax
Taumatina	Diet Max